



МИНЗДРАВ КУЗБАССА



СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

ЗАЩИТИ СЕБЯ, СЕМЬЮ, КУЗБАСС!

ПОСТАВЬ ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА!

ЗАПИСАТЬСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ:



На портале ГОСУСЛУГИ
Вакцинация от COVID-19




Записаться на вакцинацию



122

единый номер для записи
на прививку от COVID-19
в Кузбассе



Обратиться в
регистратуру
поликлиники
по месту прикрепления
полиса ОМС

Вакцинация против COVID-19 не
отменяет для привитого пациента
необходимость носить маски и
перчатки, а так же соблюдать
социальную дистанцию

Кто может привиться

Вакцинацию могут пройти граждане в возрасте от 18 лет, не имеющие на момент её проведения противопоказаний (признаков острого инфекционного заболевания, а также перенесённого инфекционного заболевания в течение 14-30 дней до вакцинации).

В приоритетном порядке вакцинации подлежат лица с высоким риском развития тяжелой формы COVID-19:

- лица старше 60 лет;
- люди с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, ожирение);
- работники социальной сферы и другие, работающие с большим количеством людей.

Нужен ли тест на антитела перед прививкой?

Тестирование перед прививкой не предусмотрено. Врач может назначить анализ методом ПЦР тем, у кого последние 14 дней был контакт с больным COVID-19 или имелись симптомы инфекционного заболевания

Как проходит вакцинация

На вакцинацию возьмите паспорт, полис ОМС и СНИЛС (необходим для получения электронного сертификата на Госуслугах).

Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся отдельно.

I этап

Введение первого компонента вакцины

Осмотр терапевтом, вакцинация, наблюдение после процедуры

II этап

Введение второго компонента вакцины

На 21 день (без учёта дня вакцинации) необходимо повторно явиться к врачу для введения второго компонента. Процедура проходит аналогично.

⚠️ Рекомендуется

В течение 3-х дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок. При покраснении, отёчности, болезненности места вакцинации принимать антигистаминные средства. При повышении температуры тела после вакцинации - нестероидные противовоспалительные средства.